

Röntgentutkimusohje

KNB - jälkihoito-ohje

Rinnastasi on otettu näytteitä _____._____.20_____

Sinulle on tehty paikallispuudutuksessa rintaan veitsellä pieni viilto ja otettu useita kudospaloja paksulla leikkaavalla neulalla.

Jälkihoito-ohje:

Puudutusvaikutuksen loputtua rinta saattaa olla useitakin päiviä arka. Myös mustelma on hyvin tavallinen ja voi kestää jopa pari viikkoa.

Tarvittaessa voi ottaa kipulääkkeeksi esim. Panadolia® tai Buranaa®.
Vuotoriskiä lisääviä (esim. Disperin®, Asperin®) kannattaa välttää.

Tulehdusriskin vähentämiseksi on rinnan suihkuttelua vältettävä 1 vuorokauden ja saunomista ainakin 2 vuorokauden ajan. Myös raskaita nostelemisia tulee välttää. Laitettujen siteiden on hyvä antaa olla suojana ainakin vuorokauden ajan, alimmaista laastaria voi pitää niin kauan kuin pysyy. Yleensä pistoskohta ei vuoda jälkeensä, mutta jos on kosteuden tuntoa, on siteet aukaistava ja vuotokohtaa painettava lujasti kunnes vuoto lakkaa.

Näytteiden tutkimiseen kuluu päiviä, saattaa mennä pari viikkoakin.

Vastauksen kuulet lähettävältä poliklinikalta joko puhelimitse tai sovittuna vastaanottopäivänä.

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä omaan terveyskeskukseen tai keskussairaalan röntgenosastolle puh. 040 653 4223.