

Röntgentutkimusohje

Myelografia - Selkäydinkanavan varjoainetutkimusta varten

Sinulle on varattu aika röntgentutkimukseen ____/____ 20____ Klo _____.

Tule osastolle ____ tutkimuksen esivalmisteluja ja jälkitarkkailua varten.

Tutkimuksen onnistuminen vaatii seuraavat esivalmistelut:

Tutkimuspäivänä

Tutkimusta varten syömättä ja juomatta vähintään neljä tuntia ennen tutkimusta. Säännölliseen käyttöön määrätyt lääkkeet voitte ottaa pienen vesitilkän kera.

Huom! Jos sinulla on insuliinihoitoinen diabetes, ota tarvittaessa yhteyttä diabeteshoitajaasi.

Tutkimuksen suoritus

Selkäydinkanavaan ruiskutetaan jodipitoista varjoainetta, jonka jälkeen lääkäri ottaa röntgenkuvia. Tutkimuksen kesto aika on noin 1 tunti.

Jälkihoito

Vuodelepo puoli-istuvassa asennossa 6 tunnin ajan.

Tutkimuksen jälkeen saa syödä ja juoda.

Tutkimuksen jälkeisen vuorokauden aikana voi tulla pahoinvointia ja päänsärkyä.

Huomautuksia

Tutkimusta ei tehdä raskaana oleville eikä verenohennushoitoa (Marevan®) saaville.

Jos sinulla on käytössä asetyylisalisyylihappo - lääkitys (Asa-Ratiopharm®, Asasantin Retard®, Aspirin Cardio®, Disperin®, Primaspan®) tai Plavix®-lääkitys, ota yhteys hoitavaan lääkäriin.

Tutkimusta ei tehdä raskaana oleville. 15 -45-vuotiaille naisille tutkimus tehdään 10 päivän sisällä kuukautisten alkamisesta, paitsi jos raskauden mahdollisuus on muuten poissuljettu.

Jos varaamamme aika ei sovi, tai sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, ota yhteys röntgenosastolle klo 8.00 -15.30 välisenä aikana. Puh. 040 653 4223. Peruuttamattomasta ajasta perimme kulloinkin voimassa olevan asiakasmaksulain mukaisen sakkomaksun, joka on ilmoitettu sairaalan nettisivuilla.