

NEFROSTOMIA

Sinulle on varattu aika nefrostomiaan eli munuaisaltaan katetrintiin. Tulet vuodeosastolle _____ tutkimuksen esivalmisteluja ja jälkitarkkailua varten ____ / ____ 20____ klo_____.

Tämä toimenpide tehdään silloin, kun virtsan pääsy rakkoon on jostain syystä estynyt. Munuaisaltaaseen laitetaan ihon kautta ohut katetri eli dreeni, josta virtsa valuu keräyspussiin. Toimenpide tehdään läpivalaisukontrollissa, joten siinä käytetään röntgensäteitä ja jodivarjoainetta.

Toimenpiteeseen valmistautuminen

Ole hyvä ja ota yhteyttä toimenpideajan antaneeseen yksikköön (poliklinikka tai vuodeosasto) mahdollisimman pian, mikäli käytät veren hyytymiseen vaikuttavia lääkkeitä (esim. Marevan®, Plavix®, Fragmin®) eikä näiden lääkkeiden tauottamisesta ole sovittu. Ota yhteyttä myös, jos sinulla on puudutusaine-, varjoaine- tai jodi-yliherkkyys tai olet raskaana.

Toimenpidettä varten sinulta otetaan verikoe vuototaipumuksen ja munuaisen toiminnan määrittämiseksi.

Pyydämme sinua olemaan syömättä, juomatta ja tupakoimatta neljä (4) tuntia ennen toimenpidettä. Säännölliseen käyttöön määrätyt lääkkeet voit ottaa aamulla pienen vesimäärän kanssa. Mahdollisesta sokeritautilääkityksen ottamisesta voi keskustella oman diabeteshoitajan kanssa.

Toimenpiteen suorittaminen

Röntgenhoitajat valmistelevat sinut toimenpiteeseen, avustavat röntgenlääkärinä ja seuraavat vointiasi koko toimenpiteen ajan. Valmistelu mukaan lukien toimenpide kestää noin tunnin.

Röntgenlääkäri puuduttaa ihon selän tai kyljen puolelta munuaisen kohdalta. Hän vie dreenin suoraan iholta munuaiskudoksen läpi munuaisaltaaseen ultraääni- ja läpivalaisuohjauksessa ja kiinnittää sen ihoon ompeleella. Ompeleita ei välttämättä aina laiteta. Röntgenhoitaja kiinnittää dreenin iholle vielä liimasiteellä ja yhdistää sen keräyspussiin.

Toimenpiteen jälkeen huomioitavaa

Toimenpiteestä aiheutuvat haittavaikutukset ovat harvinaisia. Joskus munuaisen läpi pistäminen voi aiheuttaa verenvuotoa. Erittäin harvinaisia haittavaikutuksia ovat varjoaine- tai lääkeaineyliherkkyys.

Toimenpiteen jälkeen olet vuodelevossa 2 - 4 tuntia mahdollisen esilääkityksen vuoksi. Vuodeosaston lääkäri kertoo toimenpiteen tulokset ja mahdolliset jatkotoimenpiteet. Hän myös päättää kotiuttamisesta.

Hoito kotona

Pyydämme sinua varomaan, ettei dreeni irtoa tai tukkeudu (esim. kiertymällä). Jos dreeni ei eritä hyvin, hoitavasta yksiköstä tai terveyskeskuksesta voi kysyä huuhteluohjeita. Keräyspussi kannattaa säilyttää siten, ettei se pääse tarttumaan mihinkään. Dreenin päässä olevaa lankaa ei saa katkaista.

Toimenpidettä seuraavan vuorokauden ajan kotona pitäisi olla seuraa.

Ota yhteyttä omaan terveyskeskukseen tai hoitavaan lääkäriin, jos sinulle tulee myöhemmin toimenpiteeseen liittyviä ongelmia esim. pistokohdan verenvuotoa tai tulehdusta, kipua selän alueelle tai allergista ihottumaa.