

Askitespunktio Ultraääniohjauksessa

Sinulle on varattu aika ultraäänitutkimukseen Keski-Pohjanmaan keskussairaalan röntgenosastolle

____/____ 20____ klo _____. Ilmoittaudu röntgenosaston kansliaan.

Sinulle on varattu aika askitespunktioon eli vatsaontelon punktioon tai askitesdreneeraukseen eli vatsaontelon kanavointiin. Aluksi ultraäänellä tutkitaan vatsaontelon nestemäärää eli askitesta. Samassa yhteydessä vatsaontelosta voidaan ottaa joko näyte ja/tai poistaa ylimääräistä nestettä. Tätä kutsutaan punktioksi. Pitempiaikaiseen vatsaontelon nesteen poistoon voidaan laittaa ohut muoviletku eli dreeni, johon yhdistetään keräyspussi. Tätä hoitotoimenpidettä kutsutaan kanavoinniksi eli dreneeraukseksi. Toimenpiteessä ei käytetä röntgensäteitä.

Esivalmistelut

Ota yhteyttä toimenpideajan antaneeseen yksikköön mahdollisimman pian, mikäli käytät verenhennuslääkkeitä. Tällöin lääkäri harkitsee näiden lääkkeiden tauotuksen. Ota myös yhteyttä, jos sinulla on puudutusaineyliherkkyys. Hoitavan yksikön tekemällä laboratoriolähetteellä sinulta otetaan verikoe verenvuotoalttiuden selvittämiseksi.

Toimenpiteen suorittaminen

Ultraäänitutkimus toimenpiteineen kestää noin 20 minuuttia. Röntgenhoitaja valmistelee sinut toimenpiteeseen ja avustaa lääkäriä. Röntgenlääkäri suorittaa sen ja antaa lausunnon.

Toimenpiteen ajan olet makuulla vatsa riisuttuna paljaaksi. Röntgenlääkäri arvioi ultraäänitutkimuksen perusteella vatsaontelon nestemäärän ja määrittää sopivan pistokohdan ja -reitin. Pistoalue pestään ja puudutetaan.

Lääkäri ohjaa puudutuksen jälkeen neulan vatsaonteloon ja poistaa nestettä vatsaontelosta ruiskulla imemällä. Nestettä otetaan joko pieni määrä näytteitä varten tai tarvittaessa poistetaan suurempi määrä keräyspussiin. Toimenpiteen jälkeen hoitaja painaa pistopaikkaa noin 5 minuuttia ja laittaa haavalapun pistopaikan päälle.

Vatsaontelon kanavoinnissa eli dreneerauksessa lääkäri tekee puudutuksen jälkeen veitsellä iholle pienen viillon, jonka kautta ohjaa vatsaonteloon ohuen muoviletkun eli dreenin. Dreenin pää lukitaan saporolle, jotta se ei irtoa. Dreeniin yhdistetään hanallinen väliletku, jonka avulla säädellään nesteen poistumista. Väliletkuun yhdistetään keräyspussi, johon neste pääsee valumaan. Lopuksi röntgenhoitaja kiinnittää dreenin sidoksilla ja teipeillä iholle lenkille, jottei liukaspintainen letku pienen nykäyksen takia irtoa.

Jälkihoito

Liikkuminen on sallittua voimien mukaan vuotoriskit huomioon ottaen. Dreenipussi pitäisi kantaa pistokohdan alapuolella, jotta virtaus olisi pussiin päin (kävellessä esim. reisitaskussa). Ascitesnesteen valuttaminen hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan. Toimenpidettä seuraavan vuorokauden aikana kotona pitäisi olla seuraava.

Huomautuksia

Jos varaamamme aika ei sovi sinulle tai sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, ota yhteys röntgenosastolle klo 8.00 -15.30 välisenä aikana. Puh. 040 653 4223.