

Ihminen keskiössä
Individen i centrum

Kirurgian poliklinikka

Puh. 06 8264262 Ma-Ti/To-Pe klo 8:30-9:00

VALMISTAUTUMISOHJE, Botox -hoito kirurgian poliklinikalla

Botox (botuliinitoksiini) -hoito

Botuliinitoksiinia käytetään virtsarakon yliaktiivisuuden ja sulkijalihaskouristuksen hoitoon. Toimenpide tehdään urologian poliklinikalla virtsarakon täyhystyksen yhteydessä paikallispuudutuksessa. Toimenpiteessä botuliinitoksiinia ruiskutetaan useampaan kohtaan sulkija- tai rakkolihaksen alle.

Hoidon vaikutus tulee esiin noin viikon kuluessa ja vaikutusaika vaihtelee yksilöllisesti 2 - 9 kuukauden välillä.

Valmistautuminen

Käykää antamassa virtsanäyte kutsukirjeessä annetun ohjeen mukaan. Mikäli näytteessä todetaan tulehdus, teille ilmoitetaan toimenpiteen siirrosta ja saatte lääkereseptin kotiin. Toimenpidepäivänä saatte syödä ja juoda sekä ottaa säännöllisesti käyttämäne lääkkeet normaalisti. Suorittakaa huolellinen alapesu kotona ennen toimenpiteeseen lähtöä.

Toimenpiteen suorittaminen

Virtsaputken suuaukko puhdistetaan ja virtsaputki puudutetaan puudutegeelillä. Sen jälkeen urologi vie virtsaputken kautta rakkoon ohuen tähystimen ja ruiskuttaa botuliinitoksiinia rakon seinämään.

Toimenpiteen jälkeen

Yleensä toimenpiteen jälkeen voi heti kotiutua. Joskus kuitenkin on tarpeen varmistua, että virtsaaminen lähtee toimenpiteen jälkeen sujumaan normaaliin tapaan. Tällöin virtsauksen sujuvuutta seurataan poliklinikalla.