

## IMPLANTTILEIKKAUS

### Keinojuuri eli implantti

Puuttuvat hampaat voidaan korvata keinojuurilla. Myös kokoproteesin pysyvyyssongelmiin on mahdollisuus saada apua keinojuurista. Keinojuurilla voidaan korvata myös täysin hampaattomia leukoja. niiden varaan voidaan yksilöllisesti suunnitella joko irrotettava tai kiinteä proteettinen ratkaisu. Hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti hammaslääkärin ja teknikon kanssa.

### Kenelle keinojuuri sopii?

Keinojuuri sopii lähes aina puuttuvan hampaan korvaamiseen. Leukojen alueelle saatu sädehoito ja tupakointi huonontavat hoidon onnistumismahdollisuutta. Eräät yleissairaudet saattavat olla esteenä keinojuurihoidolle. Keinojuurihoidon edellytyksenä on riittävä luun määrä hampaattomalla alueella.

### Toimenpide

Toimenpide suoritetaan joko paikallispuudutuksessa tai puudutteen lisäksi voidaan antaa myös rauhoittava lääke suun kautta tai suonensisäisesti. Keinojuuret asetetaan leukaluuhun siten, että ne sijaitsevat näkymättömissä suun limakalvon alla tai vain hieman näkyvissä. Paranemisajaksi alueelle voidaan tehdä väliaikainen proteettinen ratkaisu.

### Ruokailu

Paikallispuudutuksessa tehtävät toimenpiteet eivät edellytä ravinnotta oloa. On hyvä syödä ennen toimenpidettä, koska toimenpiteen jälkeen pitää olla kaksi tuntia syömättä.

### Lääkitys

Ottakaa teille määrätyt lääkkeet normaalisti ennen toimenpidettä, paitsi diureetit. Mikäli teillä on verenohennuslääkitys käytössä, neuvotelkaa siitä hoitavan hammaslääkärin kanssa.

Ihminen keskiössä  
Individen i centrum

Suu- ja hammassairauksien poliklinikka

Puh. (06) 826 4701 ma-to klo 8-15, pe klo 8-14

## Huomioitavaa implanttileikkauksen jälkeen

### LEIKKAUKSEN JÄLKEINEN VIIKKO

- Ole kaksi tuntia syömättä ja juomatta toimenpiteen jälkeen
- Vältä voimakasta fyysistä rasitusta ja saunomista
- Vältä tupakointia
- Vältä pureskelua leikkausalueella, syö vain pehmeää ja viilennettyä ruokaa. Huuhtelee suu ruokailun jälkeen vedellä.
- Puhdista hampaasi säännöllisesti ja huolellisesti, mutta ole varovainen leikkausalueen kanssa. Älä käytä sähköhammasharjaa.
- Käytä proteeseja saamiesi ohjeiden mukaisesti
- Muista riittävä kipulääkitys. Kivun kokeminen on yksilöllistä. Paranemisen kannalta on kuitenkin hyvä, että leikkausalue on kivuton. Ota säännöllisesti tulehduskipulääke ja tarvittaessa Panadol 1g. Sinulle suositellaan kipulääkkeeksi: \_\_\_\_\_
- Ompeleet sulaavat/poistetaan: \_\_\_\_\_
- Ota tarvittaessa yhteyttä suu- ja hammassairauksien pkl:lle

### OMPELEIDEN POISTON JÄLKEISET 6 VIIKKOA

- Vältä edelleen sähköhammasharjan käyttöä
- Vältä leikkausalueen koskettelua, älä painele leikkausaluetta sormilla tai kielellä
- Vältä edelleen kovan ruuan syömistä
- Vältä edelleen näinä viikkoina erittäin voimakasta fyysistä rasitusta