

## KEUHKOPUTKIEN TÄHYSTYS ELI BRONKOSKOPIA

Tutkimus tehdään keuhkosairauksien poliklinikalla. Tutkimuksen avulla selvitetään keuhkoputkien tilaa ja rakennetta ja otetaan erilaisia näytteitä.

### TUTKIMUKSEEN VALMISTAUTUMINEN:

#### Ennen tutkimusta

- Tupakoimatta tutkimuspäivää edeltävästä illasta
- Syömättä ja juomatta tutkimusaamuna
- Ota astma- ja muut hengitettävät lääkkeet normaalisti, myös tutkimusaamuna.
- Ota pienen vesimäärän (n.0.5 dl) kanssa kaikki säännöllisesti käyttämäne aamulääkkeet
- Ilmoita henkilökunnalle, jos sinulla on allergiaa

#### Tutkimuksen kulku

- Tutkimuspäivänä ennen tutkimusta saat mahdolliset esilääkkeet. Nielu ja hengitystiet puudutetaan.
- Tähytys tehdään taipuisalla tähystinputkella suun tai nenän kautta, tutkimus kestää n.10-30 min.
- Tutkimuksen aikana voitiasi seurataan ja tutkimus ei estä normaalia hengitystä.

#### Tutkimuksen jälkeen

- Seuraamme voitiasi 3-4 tuntia esilääkkeistä riippuen, jonka aikana saat levätä.
- Sinun on oltava ravinnotta, koska nielun ja hengitysteiden puudutus kestää 2-3 tuntia.
- Kotiin pääset seuranta-ajan jälkeen, saatuasi jatkohoito-ohjeet.
- Tutkimuspäivänä on hyvä välttää voimakasta räsitusta ja saunomista.
- Ohimenevää lämmön nousua ja vähäistä veriyskää saattaa esiintyä tutkimuspäivänä. Mikäli sinulla on runsasta veriyskää, hengenahdistusta, rintakipua tai muuta vastaavaa oiretta, ota yhteys päivystykseen.
- Mahdollisesti annetun esilääkkeen vuoksi autolla saa ajaa vasta toimenpidettä seuraavana aamuna. Pyydämme, että järjestät omaisen hakemaan sinut. Tarvittaessa kirjoitamme todistuksen taksin käyttöä varten.
- Tutkimuspäiväksi saat sairauslomaa. Tutkimusta seuraavana päivänä voit mennä normaalisti töihin, ellei sairausloma jatku muusta syystä.

### HUOMIOITAVAA

Jos sinulla on insuliinihoitoinen diabetes, kysy diabeteshoitajaltasi tutkimusta varten insuliiniannostelu ohjeita. Ota omat insuliinit mukaan.

Jos sinulla on puuduteaineallergia tai käytät verenohennuslääkettä (**Arixtra, Brilique, Clopidigrel, Efiend, Eliquis, Enoxaparin Becat, Fragmin, Ghemaxan, Inhixa, Innohep, Klexane, Lixiana, Marcoumar, Marevan, Orgaran, Orisantin, Persantin, Phenindione, Plavix, Pradaxa, Tiklyd, Xarelto**)

Ihminen keskiössä  
Individen i centrum

Sisätautien ja keuhkosairauksien poliklinikat sekä skopiakeskus

06-826 4349

tai tarvitsset endokardiittiprofylaksian ennen tutkimusta ota yhteyttä keuhkopoliklinikalle saadaksesi tarkemmat ohjeet kyseisestä lääkityksestä.

Tarvittaessa ota yhteyttä keuhkosairauksien poliklinikalle ma-to klo 8-16 pe 8-14 puh. 06-826 4349. Voit jättää sairaanhoitajalle takaisin soittopyynnön.

Ota reseptit tai lääkelista mukaan.