

Leikkausosasto (06) 8264 637
Korvapoliklinikka (06) 8264 279
Yhteispäivystys 116 117

KIELIJÄNTEEN KATKAISU (FRENULOTOMIA)

Toimenpide

Kielijänne kiinnittää kielen suunpohjaan. Hyvin lyhyt kielijänne voi haitata kielen kärjen nostamista edellyttävien äänteiden tuottamista (-R). Joskus myös imeväisikäisen imeminen voi vaikeutua lyhyen kielijänteen vuoksi.

Kielijänteen katkaisu tehdään yleensä nukutuksessa päiväkirurgisesti tai paikallispuudutuksessa poliklinikalla.

Katkaisun jälkeen leikkaushaavaan voidaan laittaa sulavat ompeleet arpeutumisen ehkäisemiseksi.

Kotihoito

Puudutuksen vaikutuksen lakattua voi lapsella tuntua kipua suunpohjassa. Kipulääkettä on syytä antaa kolmen ensimmäisen vrk:n ajan.

Lapset toipuvat kielijänteen katkaisusta yleensä nopeasti. Hoitoon voi mennä seuraavana päivänä. Toimenpidepäivänä lapsen on hyvä nauttia sosemaista, viileää ruokaa. Ruokailun jälkeen suu on hyvä huuhdella vedellä. Hampaat saa pestä normaalisti toimenpidepäivänä, hammastahnan käytön voi aloittaa seuraavana päivänä.

Jatkohoito

Aktiivinen kielen jumppa aloitetaan kirjallisten ohjeiden mukaan kolmantena päivänä toimenpiteestä.

Kielijänteen katkaisun jälkeen ei yleensä tarvita jälkikontrollia.