

Leikkausosasto (06) 8264 637

KOHTUONTELON TÄHYSTYS ELI HYSTEROSKOPIA

Kohtuontelon tähystyksellä eli hysteroskopiolla tutkitaan kohtuonteloa näkökontrollissa mm. etsittäessä vuotohäiriöiden syytä, epäiltäessä esim. polyypia (kohdun hyvälaatuinen limakalvokasvain) tai myoomaa (kohdun hyvälaatuinen lihaskasvain).

Toimenpide

Toimenpide tehdään leikkausosastolla nukutuksessa. Lääkäri tarkastelee kohtuonteloa emättimen kautta viedyn tähystimen avulla. Tähystyksen yhteydessä voidaan tehdä polyypin tai myoman poisto ja ottaa näytteitä.

Tutkimus suoritetaan kuukautiskierron alkupuolella, vuodon loputtua.

Toipuminen

Toimenpiteen jälkeen alavatsalla voi olla kuukautiskivun kaltaista tuntemusta, johon voi tarvittaessa ottaa särkylääkettä.

Jälkivuoto on yksilöllistä ja voi jatkua 5-10 vuorokautta. Vuodon aikana tulee välttää sukupuoliyhdyntää, tamponin käyttöä, uimista sekä ammekylpyjä tulehdusvaaran vuoksi.

Sairausloma on noin 1-5 vuorokautta, toimenpiteen laajuudesta riippuen. Sairausloman aikana tulee levätä ja välttää fyysistä rasitusta.

Jälkitarkastus sovitaan erikseen naistentautien poliklinikalle tai terveystieteiden keskukseseen.

Mikäli vuoto muuttuu runsaammaksi tai pahanhajuiseksi, tulee alavatsakipuja tai lämpö nousee, on syytä ottaa yhteyttä naistentautien poliklinikalle puh.(06) 826 4350 tai yhteispäivystykseen 116 117.