



POTILASOHJE

06-8264200

## LAPSEN KORVAKIPU

Äkillinen välikorvantulehdus tai lyhyemmin korvatulehdus on yleinen pienten lastentauti, ja korvatulehduksen epäily on tavallisimpia lasten lääkärisäkäynnin syitä. Korvatulehdus ei johdu ulkoisista tekijöistä, kuten huonosta korvien suojaamisesta kylmällä ilmalla. Korvatulehdus ei myöskään tartu lapsesta toiseen, vaan kyse on lapsen omien nenänielussa asustelevien bakteerien aiheuttamasta tulehduksesta. Lapsen korvakipu voi johtua bakteeri-, virus- tai sieninfektiosta, allerginen reaktio tai ihottumaa korvakäytävässä.

### Oireet

Korvakipu voi alkaa hyvinkin nopeasti ja korvatulehduksen yhteydessä esiintyy yleensä yskää ja nuhaa, lapsella voi olla myös kuumetta. Korva voi olla punoittava, erittävä ja kutiseva. Pienellä lapsella korvien ”harominen” ja yölevottomuus ovat yleensä merkki korvakivusta, isommat lapset saattavat valittaa kuulon huonontumista. Välikorvatulehdus hoidetaan useimmiten antibiooteilla.

Kipua voi helpottaa apteekista ilman reseptiä saatavilla lääkkeillä, lääkepakkauksen ohjeen mukaan (Panadol mixtuura, Pamol F). Myös kohoasento nukkuessa voi helpottaa kipua. Korvaan ei tule päästää vettä (peseytyessä korvat tulee suojata korvatulpilla, joita voi ostaa apteekista). Korvia ei tule puhdistaa pumpulipuikoilla.

### Milloin hoitoon?

- o Flunssainen lapsi muuttuu kivuliaaksi tai alkaa heräillä yöllä.
- o Pienen lapsen flunssa pitkittyy yli kahden viikon mittaiseksi.
- o Leikki-ikäinen lapsi tai koululainen sanoo korvan olevan kipeän.
- o Korva alkaa vuotaa märkää.
- o Silmien rähmiminen jatkuu hoidosta huolimatta.
- o Lapsi, jolla on ilmastointiputket, muuttuu kivuliaaksi tai korva alkaa vuotaa tai vuoto ei lakkaa usean päivän antibioottihoidosta huolimatta.
- o Herää epäily, että lapsen kuulo on alentunut.

Korvakipu ei ole päivystysasia, mutta mikäli korva selkeästi erittää märkää / verta, yhteys päivystysaikana lastenpäivystykseen puh.nro (06) 826 4444, muuten arkena yhteys omaan terveyskeskukseen.