

MITOMYSIINI RAKKOHUUHTELU

Rakonsisäinen huuhteluhoito on menetelmä, jossa lääkeaine viedään suoraan virtsarakkoon virtsaputken kautta asennetun katetrin kautta. Toimenpide on lyhykestoinen. Mitomycin-rakkohuuhteluhoito toteutetaan urologin ohjeen mukaan.

Ennen toimenpidettä

Vie virtsanäyte kutsukirjeen ohjeen mukaan. Vältä nesteiden nauttimista 8 tuntia ennen toimenpidettä. Aamupalan voit syödä ja aamulääkkeet ottaa normaalisti. Jos käytät nesteenpoisto-lääkkeitä, ne on suositeltavaa ottaa vasta hoidon jälkeen.

Mitomysin lääkeainetta pidetään rakossa kaksi tuntia, ei pidempään. Sinä aikana on hyvä olla liikkeellä ja vaihtaa asentoa. Näin varmistetaan lääkkeen leviäminen joka puolelle rakon seinämää.

Toimenpiteen jälkeen

Yleensä voi kotiutua heti toimenpiteen jälkeen ja lääkeaine virtsataan pois kotona.

Hoitopäivänä on pestävä alapesu juoksevalla vedellä jokaisen virtsaamiskäynnin jälkeen. Huolellinen käsienpesu on myös tärkeää WC:ssä käynnin jälkeen. WC-käynnin jälkeen pytty huuhdellaan WC-kannen ollessa kiinni. Myös miesten suositellaan virtsaamaan istualtaan mahdollisten roiskeiden välttämiseksi. Toimenpidepäivänä on suositeltavaa juoda tavallista runsaammin, jotta rakko huuhtoutuu ja mahdolliset ärsytysoireet lievittyvät.

Muuta huomioitavaa

Partnerin suojaamiseksi suositellaan kondomin käyttöä tai sukupuoliyhteydestä pidättäytymistä viikon ajan hoidon jälkeen.

Yhteystiedot

Kirurgian poliklinikka ma-ti, to-pe kello 8.30- 9:20 / uroterapeutti