

## NIVUSTYRÄLEIKKAUS

**Lasten nivustyrä** on sikiöasteinen kehityshäiriö, joka ei välttämättä tule esille moneen vuoteen. Tyrä on vatsakalvosta muodostunut ohutseinäinen pussimainen uloke, joka pullistuu nivuskanavaan.

### Toimenpide

**Nukutuksessa** tehtävässä leikkauksessa venyttyneen vatsakalvon muodostama tyräpussi sidotaan tyvestään ja poistetaan.

### Kivunhoito

Leikkauksen loppuvaiheessa haavan seutu puudutetaan pitkävaikutteisella puudutusaineella, jotta leikkauksen jälkeinen kipu olisi mahdollisimman vähäistä. Antakaa lapselle **kipulääkettä säännöllisesti** parin päivän ajan.

### Haavanhoito

Leikkauksen jälkeen haavalla saattaa esiintyä turvotusta ja mustelmaa. Haava suljetaan **sulavilla ompeleilla**. Haavan päällä olevan läpinäkyvän kalvon saa poistaa 5 vuorokauden kuluttua leikkauksesta. **Suihkuun** lapsi saa mennä vuorokauden, **saunaan** viikon kuluttua leikkauksesta.

### Toipuminen

Haavaan laitettu puuduteaine voi aiheuttaa leikatun puolen jalkaan tilapäistä voimattomuutta.

Toimenpidepäivänä lapsi tarvitsee lepoa ja aikuisen valvontaa. Lapsi saa liikkua kivun sallimissa rajoissa. Kouluun/päiväkotiin voi mennä 1-2 päivän kuluttua toimenpiteestä. Isompien lasten on syytä olla poissa koululiikunnasta viikon ajan.

Mikäli haavan paranemisessa tai lapsen voinnissa esiintyy ongelmia, ottakaa yhteyttä omaan neuvolaan, leikkausosastoon puh. 06 826 4637 tai lastenpäivystykseen puh. 06 826 4444.