

## Ohje potilaalle, jolta on poistettu polyyppi

Sinulta on tänään poistettu polyyppi tai polyyppeja paksusta suolesta. Polyypin poisto on yleensä turvallinen toimenpide, mutta voi joskus aiheuttaa verenvuotoa tai erittäin harvoin suolen puhkeamisen pienelle alueelle. Siksi on huomioitava seuraavat asiat:

Huolehdi siitä, että ilma tulee suolesta mahdollisimman nopeasti ulos. Vatsaa voi painella ja liikkuminen auttaa päästämään ilmaa pois suolistosta. Ilmavaivat voivat sekoittaa oirekuvaa.

Jos n. vuorokauden sisällä tutkimuksesta tulee runsasta kirkasta verenvuotoa tai tummia hyytymiä peräsuolesta, ota tällöin yhteyttä päivystykseen puh 116117.  
(Huom! koepalan otosta voi aina vähän tulla verta saman päivän aikana, mutta ei enää seuraavana päivänä)

Jos suoleen tulee puhkeama, se ilmenee joko saman päivän aikana tai seuraavan päivän aikana. Suolen puhkeama aiheuttaa vatsakipua, turvotusta, vilunväristyksiä ja lämmön nousua. Jos sinulla esiintyy em. oireita, ota yhteys päivystykseen puh 116117.

Polyypilla tarkoitetaan suolen limakalvolta kohoavaa ympäristöstään selvästi erottuvaa kohoumaa. Polyyppi voi olla kapean varren päässä oleva pyöreähkö kasvain tai limakalvon myötäinen kohoama. Kooltaan ne voivat olla millimetreistä muutamaan senttimetriin. Yleensä ne ovat hyvänlaatuisia. Polyypin laatu selviää vasta mikroskooppisessa tutkimuksessa, jonka tekee patologi n. kolmessa viikossa. Lääkäri tarkistaa koepalavastaukset ja lähettää sinulle niistä kirjeen tarvittaessa. Poliklinikan käyntitekstit ja vastaukset ovat nähtävissä Omakanta-palvelussa muutaman viikon kuluessa. ([www.kanta.fi](http://www.kanta.fi))