

Ihminen keskiössä
Individen i centrum

Sisätautien ja keuhkosairauksien poliklinikat sekä skopiakeskus

AIKA TUTKIMUKSEEN:

OHJEITA METAKOLIINIALTISTUSKOKEESEEN TULEVALLE

Metakoliinialtistuskokeessa mitataan keuhkoputkien supistumisherkkyyttä. Tutkimus kestää 1 tunnin.

HUOMIOITAVAA

- tutkimusta ei tehdä raskaana olevalle
- tutkimus voidaan tehdä kaksi viikkoa hengitystieinfektion ("flunssan") paranemisesta
- 4 tuntia ilman kahvia, teetä, kolajuomia ja muita pirstavia aineita sekä raskasta ateriaa välttäen (ei kuitenkaan ravinnotta)
- 1 vrk ilman alkoholijuomia
- 2 tuntia tupakoimatta
- 2 tunnin ajan vältettävä voimakasta fyysistä rasitusta

Ennen tutkimusta tulee olla ilman seuraavia lääkkeitä taulukossa mainittu aika. Mikäli vointisi huononee lääketauon aikana, ota yhteys lääkäriisi tai tarvittaessa päivystykseen **Ilmoita keuhkopoliklinikalle, jos käytät kortisonitablettilääkitystä (esim. Hydrocortison, Medrol, Prednisolon, Solomet).**

Lopeta seuraavat keuhkolääkkeet:

4 viikkoa ennen tutkimusta:

Aerobec	Bufomix	Pulmicort	Seretide
Alvesco	Enerzair	Relvar	Symbicort
Asmanex	Flixotide	Salfumix	Trelegy
Aectura	Fluticason	Salmeson	Trimbow
Beclomet	Flutiform	Salmex	
Budesonid	Innovair	Salmeterol	
Budair sumute	Novopulmon		

7 vuorokautta ennen tutkimusta: **Bevespi, Onbrez, Seebri, Striverdi, Ultibro**

5 vuorokautta ennen tutkimusta: **Daxas ja kaikki antihistamiiniryhmän lääkkeet esim. Aerius, Histec, Kestine, Levocetirizin, Zyrtec**

4 vuorokautta ennen tutkimusta: **Astecon, Montelukast, Singulair, Zafirlucast**

3 vuorokautta ennen tutkimusta: **Kaikki yskänlääkkeet ja seuraavat lääkkeet:**

Aminocont	Eklira	Onbrez	Spiriva
Anoro	Incruse	Retafyllin	Theofol(comp)
Duaclic	Inspiolto	Striverdi	Theospirex inj

Ihminen keskiössä
Individen i centrum

Sisätautien ja keuhkosairauksien poliklinikat sekä skopiakeskus

2 vuorokautta ennen tutkimusta:

Cykloterol
Fomeda

Foradil
Formaxa

Formoterol
Oxis

Serevent

1 vuorokausi ennen tutkimusta:

Atrodual
Atrovent comp

Intal
Ipratropium/Salbutamol

Tilade

12 tuntia ennen tutkimusta:

Adrenalin/ Epipen
Airomir
Bricanyl

Buventol
Efedrin
Racinephrine

Ventoline

Tarvittaessa ota yhteyttä keuhkosairauksien poliklinikalle ma-to klo 8-16 pe 8-14 puh. 06-826 4349. Voit jättää sairaanhoitajalle takasinsoittopyynnön