

OHJEITA SYDÄMEN SEPELVALTIMOIDENVARJOAINEKUVAAKSEEN JA/TAI PALLOLAAJENNUKSEEN TULEVALLE

Lääkitys: Jos käytätte;

Sokeritautilääkkeitä: (Diformin, Diformin Ret, Metforem, Glucophage Oramet, Avandamet) tauottakaa ne 2 päivää ennen ja 2 päivää jälkeen tutkimusta.

Tulehduskipu- ja särkylääkkeitä, jättäkää ne ottamatta 2 päivää ennen ja 2 päivää jälkeen tutkimusta. Kipuun voitte tarvittaessa käyttää parasetamolia (Paratabs, Panadol) **HUOM!** Asperiini (Primaspan, Disperin, Asperin-Cardio) pitää ottaa normaalisti.

Muut lääkkeet voitte ottaa normaalisti.

Ottakaa sairaalaan mukanne:

nykyiset reseptit ja kelakortti.

mahdollisesti käytössänne olevat astmasuihkeet ja silmätipat.

Henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät välineet

Ilmoittakaa sairaalaan tullessanne mahdollisista jodi-, varjoaine-, lääkeaine- tai ruoka- aineallergioistanne.

Jättäkää arvoesineet kotiinne (sairaala ei vastaa arvoesineistä).

Valmistautuminen kotona:

Toimenpidettä edeltävänä iltana voitte syödä ja juoda normaalisti. Yöllä voitte juoda vettä.

Toimenpideaamuna **olette syömättä.** Aamulääkkeenne voitte ottaa normaalisti veden kanssa, mutta jättäkää nestepoistolääke ottamatta.

Pistäkää tutkimusaamuna pitkävaikutteisesta insuliinistanne puolet.

Mikäli käytätte ateriainsuliinia, pistäkää se toimenpiteen jälkeen ruokailun yhteydessä.

Ennen toimenpidettä sairaalassa:

Sairaanhoitaja ottaa Teidät vastaan. Lääkäri tutkii Teidät ja käy läpi sairautenne ja toimenpiteeseen liittyvät asiat.

Sairaanhoitaja laittaa Teille laskimokanyylin nesteytystä ja lääkitystä varten. Halutessanne saatte rauhoittavaa lääkettä ennen toimenpidettä.

Sepelvaltimoiden varjoainekuvauks:

Toimenpide tehdään reisi- tai rannevaltimon kautta paikallispuudutuksessa. Valtimeen vietään ohut katetri, joka ohjataan sydämen sepelvaltimeen. Katetrin kautta ruiskutetaan varjoainetta ja samalla otetaan röntgenkuvia. Kuvauksista nähdään sepelvaltimoiden rakenne ja mahdolliset ahtaumakohtat. Toimenpide kestää noin ½ - 1 tuntia.

Saatte tietää tutkimustuloksen kuvauksen päätyttyä. Kuvauksen perusteella päätetään jatkohoidosta.

Pallolaajennus:

Pallolaajennus voidaan tehdä joko varjoainekuvauksen yhteydessä tai myöhemmin eri kerralla.

Pallolaajennus tehdään samalla tavalla paikallispuudutuksessa kuin varjoainekuvauks.

Sepelvaltimon ahtaumakohtaan vietään pallokatetri. Katetrin päässä oleva pallo täytetään varjoaineella, jolloin se laajentuessaan avaa ahtauman. Tarvittaessa ahtaumakohtaan asetetaan metallinen tukiverkko eli stentti tukemaan laajennusta.

Ohitusleikkaus:

Jos sepelvaltimon ahtaumakohtia ei voida hoitaa pallolaajennuksella eikä lääkehoito riitä, päädytään ohitusleikkaukseen.

Toimenpiteen jälkeen:

Toimenpiteen jälkeen joudutte olemaan vuodelevossa erikseen määrättävän ajan. Pistoskohdan päälle laitetaan paino jälkivuodon estämiseksi.

Kotiin pääsette samana päivänä tai seuraavana aamuna toimenpiteestä riippuen. Toimenpidepäivänä kotiutuvilla tulee olla aikuinen seuralainen yön yli, sairausloman pituus määräytyy yksilöllisesti.

Toimenpidepäivänä autolla ajaminen on kielletty.

Omaisillanne on mahdollisuus tiedustella voitintanne seurantahuoneen hoitajalta (06) 826 4920 klo 12.00 jälkeen.

Tervetuloa sydäntoimenpideyksikköön!