

OHJEITA TAUOTETTAVISTA LÄÄKKEISTÄ LEIKKAUKSEEN TULEVALLE POTILAALLE

Verenhiyttämiseen vaikuttavat lääkkeet esim. **Marevan®**, **Marcoumar®**, **Plavix®**, **Pradaxa®**, **Clopidogrel®**, **Tiklyd®**, **Efient®**, **Briligue®**, **Xarelto®**, **Arixtra®**, **Klexane®**, **Fragmin®**, **Innohep®**, **Eliquis®**, **Lixiana®**.

Ota yhteyttä hoidonvaraajaan, jos sinulla on jokin verenohennuslääke käytössä.

Mikäli sinulle on järjestetty aika esikäynnille, saat tauotusohjeet esikäynnin yhteydessä.

Omega 3:a sisältävien valmisteiden käyttö on lopetettava **1 viikko** ennen toimenpidettä.

Reumalääkkeet

Reumalääkkeet tauotetaan reumalääkärin ohjeen mukaan. Ohje tulee kutsukirjeen mukana. Voit ottaa myös yhteyttä reumasairauttasi hoitavaan yksikköön mikäli tarvitset tarkempia ohjeita.

Syövän hoidossa käytettävät lääkkeet

Avastin®, **Stivarga®**, **Zaltrap®** tauotetaan **4 viikkoa** ennen leikkausta.

Tamofen® tauotetaan **2 viikkoa** ennen toimenpidettä.

Glivec®, **Inlyta®** tauotetaan vähintään **2 viikkoa** ennen toimenpidettä.

Sutent®, **Nexavar®**, **Votrient®**, **Afinitor®**, **Tarceva®**, **Iressa®**, **Zelboraf®**, **Taniflar®**, **Giotrif®**, **Xalkori®**, **Tyverb®** tauotetaan vähintään **1 viikkoa** ennen toimenpidettä. (Mikäli veriarvoissa poikkeavuutta, tarvittaessa aiemmin.)

Jos saat syöpäsairauttesi hoitoon tällä hetkellä sytostaattia ja/tai muita hoitoja, ota yhteyttä Syöpätautien poliklinikalle tarkempien ohjeiden saamiseksi.

Psykyen lääkkeet

Ota yhteyttä hoidonvaraajaan, jos sinulla on käytössä jokin seuraavista **Leponex**, **Froidir**, **Clozapine**.

Lisätietoja tarvittaessa antaa hoidonvaraajat, **soittoaika arkisin klo 9-10:**

06 826 4777 ma - pe (hammas- ja suukirurgia, gynekologia, lapsikirurgia, plastiikkakirurgia, proteesikirurgia)

06 826 4782 ma - pe (gastrokirurgia, urologia)

06 826 4774 ma - pe (verisuonikirurgia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, gastro- ja colonoskopia)

06 826 4788 ma - pe (ortopedia, käsikirurgia, sappileikkaukset, rintakirurgia)