

Silmukkakonisaatio

Aiheet toimenpiteen suorittamiselle

Sinulle on aiemmin tehty kolposkopia, jonka yhteydessä otetuista koepaloista on löytynyt kohdunkaulan solumuutos, joka on nyt tarkoitus poistaa. Silmukkakonisaatio tehdään siis irtosolukokeessa todetun ja koepalalla varmistetun solumuutoksen poistamiseksi.

Toimenpiteen suoritus

Silmukkakonisaatio suoritetaan naistentautien poliklinikalla paikallispuudutuksessa, poikkeustapauksessa leikkausosastolla nukutuksessa tai spinaalipuudutuksessa. Toimenpiteessä poistetaan kuduskappale kohdun napukasta. Patologi tutkii palan, jolloin saadaan tarkka tieto muutoksesta ja siitä, saatiinko muutosalue kokonaisuudessaan poistettua. Hoito kontrolloidaan uudella kolposkopiolla 6 kk kuluttua.

Jälkihoito

Yleensä sairauslomaa ei tarvita, käyntitodistus voidaan halutessanne kirjoittaa. Vältä ponnistelua (esim. rankkaa liikuntaa) ja raskaiden esineiden nostelua muutamia päiviä sekä yhdyntää siihen saakka, kunnes verinen erite loppunut. Verensekainen erite emättimestä on normaalia, mutta se loppuu viimeistään parissa viikossa. Älä käytä tamponeja vaan mieluummin sidettä. Lieviä kouristelevia kipuja voi normaalisti esiintyä.

Milloin syytä ottaa yhteyttä?

Pahanhajuinen erite emättimestä, alavatsakivut ja lämpöily voivat olla merkkejä tulehduksesta. Tällöin tulee ottaa yhteyttä naistentautien poliklinikkaan tai terveyskeskukseen. Samoin, jos verinen vuoto muuttuu runsaaksi jo niukennuttuaan.