

Tyhjennysohjeita avanne- ja J-pussipotilaille

Seuraa ohjetta no: _____

Perusperiaate:

- Kun tähystetään suolta avanteesta alaspäin ruoansulatuskanavassa, ei yleensä tarvita tyhjennystä.
- Kun tutkitaan suolen toimivaa osaa eli avanteesta ylöspäin ruoansulatuskanavassa, tarvitaan tyhjennys.

1. Sigmoidostoma eli paksusuolen loppuosan avanne:

- Citrafleet, Picoprep, Moviprep tai Colonsteril -tyhjennysohjeen mukaan.
- Avannehoitajalta tai terveystieteiden keskuksen hoitovälinejakelusta potilas saa tarvittaessa ison avannetyhjennyspussin.
- Ota mukaan poliklinikalle tähystykseen tullessa puhdas avannepussi mukaan

2. Transversostoma eli poikittaisen paksusuolenavanne:

- 12 tuntia syömättä. Juotavaa voi ottaa.
- Citrafleet- / Moviprep- / Picoprep - tyhjennyksestä 1 annos edellisenä iltana tai 4-6 tuntia ennen tähystystä.

3. Ileostoma eli ohutsuoliavanne:

- 6 tuntia syömättä. Juoda voi vähän.

4. J-pussi I. suolisäiliö:

- Ei tyhjennystä. 6 tuntia syömättä, juomaa runsaasti.

5. Rektum-stumpin tähystys

- Klyx 120ml tai 240ml aamulla tai viimeistään noin 1 tunti ennen tutkimusta.

OHUTSUOLIAVANTEESEEN EI KOSKAAN RUISKETTA!

HUOM ! Jos tähystetään avanteen kautta, ota puhdas avannepussi mukaan!