



POTILASOHJE

06-8264200

VENTOLINEN ANTO-OHJE

Ventoline 0.1 mg/annos Babyhalerilla, kotihoito-ohjeet vanhemmille

Yli 1 vuotiaille lapsille

Mikäli lääkärin ohjeenmukainen vuorokausiannostus ei riitä ja lapsi ahdistaa, voitte antaa lapsellenne nk. latausannoksen:

Anna Babyhalerilla 1 suihketta ja odota, että lapsi hengittää ne (hengitys → laske 5).
Anna uudelleen 1 suihketta, odota että lapsi jälleen hengittää ne, ja vielä 1 suihketta ja jatka kunnes tilanne helpottuu, ei kuitenkaan enempää kun 6 suihketta.

Pidä 20 min tauko. Mutta... mikäli tilanne ei helpotu...

Voitte antaa jälleen 6 suihkeen sarjan (kuten aikaisemminkin), jonka jälkeen on jälleen pidettävä 20min tauko.

Mikäli hengenahdistus jatkuu, voitte toistaa vielä kerran 6 suihkeen sarjan, mutta tämän jälkeen on otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli oireet eivät helpotu.

Alle 1 vuotiaille lapsille

Toimitaan edellä olevan ohjeen mukaan, mutta 1+1+1+1 suihketta eli yhteensä 4 suihketta kerrallaan, jonka jälkeen pidettävä 20 min tauko.