

## VERIPAIKKA

Lannepiston jälkeen ilmaantuneen päänsäryn syytä ei tiedetä, sen oletetaan johtuvan selkäydinnesteen paineolosuhteiden muutoksesta. Päänsärylle on tunnusomaista paheneminen potilaan ollessa pystyasennossa. Kivun jatkuessa, lääkityksestä ja riittävästä nesteytyksestä huolimatta, voidaan joutua laittamaan ns. veripaikka pistosalueelle.

Veripaikan laittaa anestesiologi. Veripaikasta pysyvän avun voi saada jopa 90% potilaista.

### Toimenpiteen jälkeen

Potilaan tulee olla vuodelevossa kahden tunnin ajan, jonka jälkeen voi vapaasti liikkua. Ponnistamista on syytä välttää vuorokauden ajan. Oireet helpottuvat yleensä ensimmäisten tuntien kuluessa. Pistoskohdan arkuus liittyy toimenpiteeseen.

Oireita voi lievittää tavallisilla tulehduskipulääkkeillä ja parasetamolilla.

Mikäli toimenpiteen jälkeen nousee kuume, ilmaantuu poikkeuksellisen kova päänsärky, puutumisoireita alaraajoissa tai pistoskohdan ärtyneisyyttä, tulee ottaa yhteyttä yhteispäivystykseen 116 117.