

PROVOKATIONSTEST

Om Ni använder kortisonpiller (Prednisolon eller dylikt) får doseringen inte överstiga 10mg/dag!
Kortison som inhaleras påverkar inte testen.

Använd inga salvor på armarna testdagen. Tvätta armarna på testmorgonen. Använd inte antihistaminpiller eller motsvarande medicin som dämpar histaminfrigöringen 5 dagar före testen (se listan nedan).

Reservera ca 6 timmar för poliklinikbesöket.

Ifall Ni har en pågående infektion och/eller antibiotikakur, kan testet inte göras. Vi ber Er i sådana fall ta kontakt och ändra polikliniktiden.

Ta med ev. tidigare gjorda test.

Följande mediciner får inte användas 5 dagar före testen:

Aerinaze	Desloratadine	Lastin	Tavegyl
Aerius	Duact		Telfast
Alzyr	Diphenhydramine hydrochloride	Levazyr	Theralene
Atosil	Dormix	Levocetirizin(e)	Tuulix
Atarax	Dymista	Loratadin	Zyrtec
Benadryl	Fexorin	Marzine	Xyzal
Cetimax	Flynise	Nefoxef	
Cetirizin	Heinix	Nocedan	
Cirrus	Histadin	Pafinur	
Clarityn	Histec	Peritol	
Codesan comp	Hydroxyzine	Postafen	
Cyclizine	Kestine	Revitelle	
Dasselta	Kestox	Rinexin	

Vänliga hälsningar,

Personalen på polikliniken för hudsjukdomar