

INFEKTIONSRIK RELATERAD TILL BIOLOGISK BEHANDLING

Åt Er har påbörjats behandling med biologiska läkemedel p.g.a. svårbehandlad psoriasis. Vid biologisk behandling finns en ökad risk för bakterie- och virusinfektioner. Till dessa risker hör:

- lätta infektioner (ex. vanlig flunssa) och
- svåra infektioner (ex. lunginflammation, blodförgiftning, infektioner i njurarna)

Risken för svåra infektioner uppskattas vara ca. dubbelt så stor, jämfört med patienter som inte har någon biologisk behandling. Risken är störst under biologiska behandlingens första sex månader.

Därför bör Ni vara mer observant än i normala fall och söka er till läkare i tidigare skede än vanligt, ifall ni får symptom på infektion. Alla infektioner bör dessutom behandlas så effektivt som möjligt, med ex. antibiotikakurer. Vid biologisk behandling uppkommer inte feber nödvändigtvis som i vanliga fall, därför kan en feberfri infektion vara betydande.

För undvikandet av svåra infektioner får Ni dessutom en pneumokokk-vaccination. Därtill rekommenderas att Ni årligen tar influensavaccin.

Ifall Ni har en infektion, bör den biologiska behandlingen (samt eventuell pågående metotrexan-behandling) avbrytas, tills Ni är helt återställd från infektionen. Efter detta kan behandlingen fortsätta normalt. Vid behov kan Ni alltid kontakta hudpolikliniken per telefon, 06-826 4534

Renata Kaminska
Överläkare hudsjukdomar

Ovanstående information har genomgåts med mig

____/____20____
läkare/ sjuksötare

patientens underskrift