

ISOTRETINOIN-MEDICINERING I FERTIL ÅLDER

1. **Innan behandlingen påbörjas** skall en kvinna i fertil ålder ha haft **hormonell prevention** i användning minst en månad, samt ett **nyligen utfört graviditetstest (negativt)**. Under behandlingen måste åtminstone ett, helst två varandra kompletterande preventivmetoder vara i användning.
2. Obs! För personer i fertil ålder är läkemedelsordinationen **i kraft endast 7 dagar från det att receptet skrivits ut** (även fast annat datum skulle stå angivet på receptet).
3. **De blodprov som läkaren ordinerat skall tas 6-8 veckor efter det att medicineringen påbörjats.** Tid för blodprovstagning till laboratoriet bokar patienten själv.
4. **Se till att receptet förnyas i god tid**, helst 1 vecka innan medicinen tar slut. Apoteket säljer medicinen för **endast en månad åt gången**. Medicinen kan förnyas/skrivas ut endast av hudläkare.
5. **Fem (5) veckor efter avslutad behandling** skall ett nytt graviditetstest tas (på laboratoriet). Hormonell prevention bör fortsätta minst en månad efter avslutad behandling. Ifall du misstänker att du är gravid under pågående behandling, ta omedelbart kontakt med läkare.