

HUDPRICKTEST

Hudpricktest är en grundundersökning vid atopisk allergi. M.h.j.a. testet utreds överkänslighet för bl.a. pollen, djurmjäll, födoämnen och olika kemikalier. Resultatet avläses efter 15 minuter.

Hudpricktest görs på frisk hud.

Hudpricktest görs under alla årstider.

Hudpricktest görs åt gravida endast i specialfall.

Om Ni använder kortisonpiller (Prednisolon el.dyl) får doseringen inte överstiga 10mg /dag!
Kortison som inhaleras påverkar inte testen.

Använd inga salvor på armarna testdagen. Tvätta armarna på morgonen innan Ni kommer till testen.
Använd inte antihistaminpiller eller motsvarande medicin, som dämpar histaminfrigöringen **5 dagar** före testen (se lista nedan).

Ifall Ni har en pågående infektion och/eller antibiotikakur, kan testet inte göras. Vi ber Er i sådana fall ta kontakt och ändra polikliniktiden.

Ta med ev. tidigare gjorda test.

Följande mediciner får INTE användas 5 dagar före testen:

Aerinaze	Desloratadine	Lastin	Tavegyl
Aerius	Duact	Levazyr	Telfast
Alzyr	Diphenhydramine hydrochloride	Levocetirizin(e)	Theralene
Atosil	Dormix	Loratadin	Tuulix
Atarax	Dymista	Marzine	Zyrtec
Benadryl	Fexorin	Nefoxef	Xyzal
Cetimax	Flynise	Nocedan	
Cetirizin	Heinix	Pafinur	
Cirrus	Histadin	Peritol	
Clarityn	Histec	Postafen	
Codesan comp	Hydroxyzine	Revitelle	
Cyclizine	Kestine	Rinexin	
Dasselta	Kestox		

Vänliga hälsningar,
Personalen på hudpolikliniken

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | Mellersta Österbottens välfärdsområde

Hyväksyjä:
Päiväys: 26.10.2023